



MSHC

MELBOURNE SEXUAL HEALTH CENTRE

Part of AlfredHealth

580 Swanston Street
Carlton 3053
Tel: (03) 9341 6200
Free Call: 1800 032 017
Fax: (03) 9341 6279
www.mshc.org.au

전염성 연속증(물사마귀) Molluscum Contagiosum (Korean)

전염성 연속증이란?

전염성 연속증은 포스 바이러스에 의해 발생하는 무해한 피부감염질환입니다. 이 질환은 치료하지 않고 내버려둘 경우 6-18 개월 정도 지속되다 저절로 사라집니다.

전염성 연속증은 어떻게 전염되나요?

전염성 연속증은 피부간의 접촉을 통해 전염됩니다. 성인들은 대개 성행위 도중 감염이 되는 반면, 청소년들은 대개 성적인 접촉 없이 전염됩니다.

전염성 연속증의 병변은 어떤 모습인가요?

전염성 연속증은 통증이 없는 단단하고 둥근 살색 발진으로 나타나며 돌기의 중심부가 꼭지 모양으로 꺼져 있는 것이 특징입니다. 병변을 긁거나 상처를 내면 주변 부위로 퍼질 수 있습니다. 병변이 발전하기까지 수 주가 걸릴 수 있으며 어린이들은 신체 어디에든 병변이 발생할 수 있으나 성인들은 주로 허벅지, 사타구니, 엉덩이, 하복부, 성기부위 등에 발생합니다.

발진이 생길 때까지 얼마나 걸리나요?

감염시점으로부터 평균 2-3 개월 정도 걸리지만 빠르거나 길게는 1 주일에서 길게는 6 개월이 걸릴 수도 있습니다. 감염된 사람들 중 일부는 아예 발진이 나타나지 않기도 합니다.

전염성 연속증은 어떻게 진단하나요?

전염성 연속증은 병변의 특이한 외관을 근거로 진단합니다.

전염성 연속증은 어떻게 치료하나요?

발진이 대개 저절로 사라진다해도 많은 환자들은 치료를 원합니다. MSHC는 액체질소로 발진을 냉각시키거나 경우에 따라 이미퀴모드(알다라) 크림 또는 포도필로톡신 페인트를 사용하여 치료합니다. 치료 중에는 전염 예방을 위해 성기 체모의 면도/삭제/다듬기 등을 피할 것을 권장합니다.

최종 업데이트 2017년 11월