



MSHC

MELBOURNE SEXUAL HEALTH CENTRE
Part of AlfredHealth

580 Swanston Street
Carlton 3053
Tel: (03) 9341 6200
Free Call: 1800 032 017
Fax: (03) 9341 6279
www.mshc.org.au

傳染性軟疣 Molluscum contagiosum (Traditional Chinese)

什麼是傳染性軟疣?

傳染性軟疣 (MC) 是由痘病毒引起的皮膚感染，是無害的。即使不經治療，病變可能會持續 6-18 個月，最終會自動消除。

傳染性軟疣是如何傳播的？

MC 是通過皮膚與皮膚接觸傳播。在成年人中，傳染性軟疣通常是在發生性行為期間傳播，而年輕人一般不是通過性行為就可能受到感染。

感染看起來像什麼？

MC 的外觀像無痛堅實、中間有凹陷、圓形呈肉色的腫塊。如果被劃傷或受損便可能會蔓延到周圍的皮膚。病變可能需要幾週的時間才發出來，可生長在兒童身體的任何部位，在成年人身上，則通常會發在大腿、腹股溝、臀部、小腹和生殖器範圍。

腫塊會幾時發出來？

從感染開始平均需要 2-3 個月才能出現腫塊，但因人而異，可從一週到最多 6 個月不等。有些人從來都沒有任何腫塊的。

傳染性軟疣是如何被診斷的？

MC 由其獨特的外觀而被診斷出來的。

如何治理傳染性軟疣？

雖然腫塊通常會自行消失，但大多數人會選擇接受治療。墨爾本性健康中心通常會使用液氮冷凍方法，或者有時使用咪喹莫特 (Aldara) 乳膏或鬼臼毒素塗料。我們還建議您在治療過程中避免把生殖器毛髮剃掉/打蠟/修剪，以盡量減少 MC 的擴散。