



MSHC

MELBOURNE SEXUAL HEALTH CENTRE
Part of AlfredHealth

580 Swanston Street
Carlton 3053
Tel: (03) 9341 6200
Free Call: 1800 032 017
Fax: (03) 9341 6279
www.mshc.org.au

마이코플라즈마 Mycoplasma Genitalium (Korean)

마이코플라즈마란?

마이코플라즈마 제니탈리움은 요도, 자궁경부, 항문을 감염시키는 박테리아입니다.

마이코플라즈마균에 어떻게 감염되나요?

콘돔 등을 사용하지 않는 무방비 질성교와 항문성교를 통해 감염됩니다.

마이코플라즈마 감염 증상은 무엇인가요?

남성

일부 남성들은 아무 증상이 없습니다.

증상이 있는 경우, 다음을 포함할 수 있습니다:

- 소변을 볼 때 느껴지는 통증
- 고환 분비물

여성

일부 여성들은 아무 증상이 없습니다.

증상이 있는 경우, 다음을 포함할 수 있습니다:

- 아랫배 통증
- 성교시 통증
- 비정상적인 질 분비물
- 소변을 볼 때 느껴지는 통증
- 비정상적인 질 출혈

마이코플라즈마는 어떻게 검사하나요?

남성은 소변샘플, 요도 또는 항문세포 채취를 통해 감염여부를 검사합니다. 여성은 소변샘플, 질세포 또는 자궁경부세포 채취를 통해 검사합니다.

마이코플라즈마는 어떻게 치료하나요?

MSHC는 두 가지 항생제로 마이코플라즈마 감염증을 치료합니다. 두 항생제 다 복용해야 감염을 치료할 수 있습니다.

언제 다시 성관계를 갖는 것이 안전한가요?

여러분과 여러분의 파트너가 마이코플라즈마 검사에 음성반응을 보일 때까지 성관계를 가지지 않거나, 성관계시 한번도 빠짐없이 콘돔을 사용해야 합니다.

치료를 받은 후에도 추가 검사를 받아야 하나요?

네. 치료 개시 후 한 달이 경과하면 완치여부를 알아내는 검사를 통해 항생제의 효과가 있었는지 확인해야 합니다.

성파트너도 치료를 받아야 하나요?

네. 최근 성관계를 가진 모든 파트너들에게 마이코플라즈마 감염 진단을 받았다는 사실을 알리고 치료를 권유하십시오. 본 기관은 다른 곳에서 구하기 어려운 항생제를 사용하므로 가능하면 MSHC에서 치료받도록 권유하십시오. 파트너에게 감염사실을 알리는 것이 어렵다면 www.letthemknow.org.au 웹사이트를 이용하세요. 마이코플라즈마 감염 검사는 일부 클리닉에서만 받으실 수 있습니다.

재감염을 막는 방법은 무엇인가요?

질 또는 항문성교시 항상 콘돔을 사용하면 재감염을 막을 수 있습니다.