



MSHC

MELBOURNE SEXUAL HEALTH CENTRE

Part of AlfredHealth

580 Swanston Street
Carlton 3053
Tel: (03) 9341 6200
Free Call: 1800 032 017
Fax: (03) 9341 6279
www.mshc.org.au

传染性软疣 Molluscum Contagiosum (Simplified Chinese)

什么是传染性软疣？

传染性软疣是由某种痘病毒引起的无害皮肤感染。损伤如不治疗，可能持续 6-18 个月，然后自然消退。

它如何传播？

传染性软疣是通过皮肤接触传播的。成人之间的传染通常是在性活动中发生的，青少年之间的传统通常与性无关。

感染部位外观如何？

传染性软疣表现为无痛、坚实、圆形、肉色的肿块，中心微凹。如果抓挠或破损，就会扩散到周围皮肤。损伤的形成需要几个星期，儿童身体上任何部位都可能出现，成人则通常出现在大腿、腹股沟、臀部、下腹和生殖器部位。

肿块需要多长时间才会形成？

从感染之时起，肿块需要平均 2-3 个月的时间才会显现，但时间短的只需一周，时间长的则要 6 个月。有些人身上完全不出现肿块。

传染性软疣如何诊断？

传染性软疣通过其独特的外观诊断。

传染性软疣如何治疗？

尽管肿块通常会自行消失，但大多数人更愿意接受治疗。MSHC 通常对肿块进行液氮冷冻治疗，有时也使用处方药咪喹莫特（艾达乐）膏或鬼臼毒素涂抹液。我们还建议在治疗期间避免修剪或除阴毛，以尽量减少传染性软疣扩散。