



MSHC

MELBOURNE SEXUAL HEALTH CENTRE

Part of AlfredHealth

580 Swanston Street
Carlton 3053
Tel: (03) 9341 6200
Free Call: 1800 032 017
Fax: (03) 9341 6279
www.mshc.org.au

生殖支原体 Mycoplasma Genitalium (Simplified Chinese)

什么是生殖支原体？

生殖支原体是一种感染尿道、子宫颈和肛门的细菌。

它如何传播？

它通过没有保护的性交和肛交传播。

有哪些症状？

男性

有些男性会没有任何症状。

出现症状者可能会有：

- 排尿疼痛
- 阴茎分泌物

女性

有些女性会没有任何症状。

出现症状者可能会有：

- 小腹疼痛
- 性交疼痛
- 异常阴道分泌物
- 排尿疼痛
- 异常阴道出血

生殖支原体如何检测？

男性进行尿样检查、尿道拭子检查或肛门拭子检查。女性进行尿样检查、阴道拭子检查或子宫颈拭子检查。

生殖支原体如何治疗？

MSHC 对生殖支原体采用两个疗程的抗生素治疗。患者需要服用两个疗程的药物才能痊愈。

何时才能再有性活动？

你不应该有任何性交，或者在所有性接触时必须一直使用避孕套，直到你和你的伴侣的生殖支原体检查结果为阴性。

接受治疗后是否需要进一步检测？

是。开始治疗后一个月时需要进行一次检测，以确保抗生素发挥了效用。

我的性伴侣是否也应该接受治疗？

是。请告诉你最近所有的性伴侣你被诊断有生殖支原体，叫他们也去接受治疗。如果可能，让他们到 MSHC 接受治疗，因为我们使用的抗生素在别的诊所可能较难获得。如果你感到难以对你的伴侣启齿，你可以访问网站 www.letthemknow.org.au 获取帮助。生殖支原体检测只有一些诊所能够提供。

如何避免再次感染生殖支原体？

性交和肛交时都使用避孕套。