



# MSHC

MELBOURNE SEXUAL HEALTH CENTRE  
Part of AlfredHealth

580 Swanston Street  
Carlton 3053  
Tel: (03) 9341 6200  
Free Call: 1800 032 017  
Fax: (03) 9341 6279  
[www.mshc.org.au](http://www.mshc.org.au)

## 生殖支原體 *Mycoplasma genitalium* (Traditional Chinese)

### 什麼是生殖支原體？

生殖支原體 (MG) 是一種感染尿道、子宮頸和肛門的細菌。

### 如何傳播的？

生殖支原體是通過無保護的陰道交和肛交傳播。

### 有什麼症狀？

#### 男性

有些男性是沒有症狀的。

若有，會有如下症狀：

- 排尿時疼痛
- 陰莖排出分泌物

#### 女性

有些女性是沒有症狀的。

若有，會有如下症狀：

- 下腹部疼痛
- 性交時疼痛
- 陰道排出異常分泌物
- 排尿時疼痛
- 陰道異常出血

### 如何檢查生殖支原體？

對於男性，我們會通過尿液樣本，或從尿道或肛門以棉籤取樣來檢查生殖支原體。對女性則會通過尿液樣本，或從子宮頸以棉籤取樣來檢查生殖支原體。

### 如何治療生殖支原體？

我們在墨爾本性健康中心會用兩種抗生素治療生殖支原體，必須服用這兩種抗生素來治療。

### 什麼時候可以安全地恢復性生活？

您應該停止性行為，或者完全 100% 在性交時使用安全套，直到您和您的伴侶進行的生殖支原體檢查呈陰性結果。

### 接受治療後需要接受進一步檢查嗎？

需要。接受治療一個月後再接受檢驗，以確保抗生素是否有效。

### 我的性伴侶需要接受治療嗎？

需要。應當向所有最近的性伴侶說明您已經被診斷有生殖支原體感染，並要求他們接受治療。儘可能叫他們前往墨爾本性健康中心，因為我們使用的抗生素很難在其他地方找到。如果您覺得很難開口，您可以登入網站 [www.letthemknow.org.au](http://www.letthemknow.org.au) 匿名發通知給他們。只有部分診所提供對生殖支原體的檢驗。

## **如何避免再次感染生殖支原體？**

進行陰道交和肛交是一定要使用安全套。

*2017 年 11 月更新*