



# MSHC

MELBOURNE SEXUAL HEALTH CENTRE  
Part of AlfredHealth

580 Swanston Street  
Carlton 3053  
Tel: (03) 9341 6200  
Free Call: 1800 032 017  
Fax: (03) 9341 6279  
[www.mshc.org.au](http://www.mshc.org.au)

## ไมโคพลาสมา เจริตาเลียม

### Mycoplasma genitalium (Thai)

#### ไมโคพลาสมา เจริตาเลียมคืออะไร?

ไมโคพลาสมา เจริตาเลียม (เอ็มจี) เป็นแบคทีเรียที่ทำให้ท่อปัสสาวะ ปากมดลูก และ ทวารหนัก ติดเชื้อ

#### โรคนี้ถ่ายทอดได้อย่างไร?

โรคนี้ถ่ายทอดผ่านทางเพศสัมพันธ์โดยการร่วมเพศทางช่องคลอดและทางทวารหนักโดยปราศจากการป้องกัน

#### มีอาการอะไรบ้าง?

##### บุรุษ

บุรุษบางคนจะไม่มีอาการ

ส่วนบุรุษที่มีอาการอาจ:

- รู้สึกเจ็บเวลาถ่ายปัสสาวะ
- มีหนองไหลจากองคชาต

##### สตรี

สตรีบางคนจะไม่มีอาการ

ส่วนสตรีที่มีอาการอาจ:

- รู้สึกเจ็บบริเวณท้องน้อย
- รู้สึกเจ็บระหว่างร่วมเพศ
- มีหนองไหลผิดปกติออกมาจากช่องคลอด
- รู้สึกเจ็บเวลาถ่ายปัสสาวะ
- มีเลือดออกผิดปกติจากช่องคลอด

#### ท่านจะตรวจหาไมโคพลาสมา เจริตาเลียมอย่างไร?

ในบุรุษ เราจะตรวจตัวอย่างปัสสาวะ ท่อปัสสาวะ หรือทำสว๊อบที่ทวารหนัก ในสตรี เราจะตรวจตัวอย่างปัสสาวะ ช่องคลอด หรือทำสว๊อบที่ปากมดลูก

#### รักษาโรคไมโคพลาสมา เจริตาเลียมอย่างไร?

ที่ MSHC เรารักษาโรคนี้ด้วยยาปฏิชีวนะสองชุด ทั้งสองชุดเป็นยารับประทานเพื่อแก้การติดเชื้อ

#### เมื่อไหร่ที่จะร่วมเพศได้อีก?

ท่านไม่ควรร่วมเพศ หรือมีฉันทันทีต้องใช้ถุงยางอนามัย 100% เต็มทุกครั้งที่ท่านมีการสัมผัสทางเพศ และจนกว่าผลการตรวจเอ็มจีของท่านกับคู่นอนจะออกมาเป็นลบ

#### ข้าพเจ้ายังต้องรับการทดสอบต่อไปอีกไหมหลังจากที่ได้รับการบำบัดรักษาแล้ว?

ใช่ ยังต้องรับการทดสอบอยู่ต่อไปหนึ่งเดือนหลังจากที่เริ่มการบำบัด ทั้งนี้เพื่อให้เป็นที่แน่ใจว่ายาปฏิชีวนะทำงานได้ผล

#### คู่นอนของข้าพเจ้าควรรับการบำบัดรักษาด้วยไหม?

ควรได้รับ ท่านควรบอกให้ผู้อื่นทุกคนทราบว่าท่านได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคติดเชื้อเอชไอวี และขอรับรองให้พวกเขาได้รับการบำบัดรักษาด้วย ถ้าเป็นไปได้ควรชักชวนให้พวกเขามาที่ MSHC เพราะที่นี่เราใช้ยาปฏิชีวนะซึ่งที่อื่นอาจหาได้ยาก หากท่านมีความลำบากในการบอกให้ผู้อื่นทราบ โปรดไปที่เว็บไซต์ [www.letthemknow.org.au](http://www.letthemknow.org.au) การทดสอบหาเอชไอวีทำได้ที่คลินิกบางแห่งเท่านั้น

## **ข้าพเจ้าจะหลีกเลี่ยงการกลับเป็นเอชไอวีอีกได้อย่างไร?**

โดยการใช้อย่างสม่ำเสมอเมื่อร่วมเพศทางช่องคลอดและทางทวารหนัก

ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2017