

Instructions concernant le métronidazole et la clindamycine pour les partenaires ayant un pénis

À propos

Il a été démontré que le traitement des partenaires contre la vaginose bactérienne (VB) améliore la guérison de la VB et réduit les infections futures.

Le traitement de partenaires atteints de VB implique une combinaison de :

- **un comprimé** – un antibiotique oral appelé « métronidazole » ET
- **une crème** – un antibiotique appelé « clindamycine »

Les comprimés éliminent les bactéries de la VB de l'intérieur de l'urètre (le tube par lequel passe l'urine) et la crème élimine les bactéries BV de la peau du pénis.

Instructions pour les comprimés




Prenez un comprimé le matin et un le soir pendant 7 jours. Les comprimés doivent être pris avec de la nourriture.

Mode d'emploi de la crème


Appliquez la crème matin et soir pendant 7 jours. Si vous prévoyez de prendre une douche, appliquez la crème après votre douche car l'eau l'éliminera. **Suivez les étapes de 1 à 5.**

1.




Mettez une ligne de crème sur la peau du bout de votre doigt jusqu'à son premier pli, comme indiqué ci-dessus

2.




Si vous avez un prépuce, retirez-le avant d'appliquer la crème

3.




Frottez la crème sur la peau de la tête du pénis, en couvrant toute la tête, de la pointe du pénis jusqu'à la rainure juste en dessous de la tête

4.



Mettez une deuxième ligne de crème sur la peau du bout de votre index jusqu'à son premier pli

5.



Frottez cette deuxième ligne de crème depuis la rainure sous la tête du pénis jusqu'à sa base, en veillant à couvrir toute la tige. Faites doucement pénétrer la crème dans la peau



Instructions
vidéo



Informations
supplémentaires

Informations de sécurité

Le métronidazole et la clindamycine sont tous deux utilisés depuis de nombreuses années pour traiter les personnes ayant un vagin et atteintes de VB. Les deux antibiotiques sont sûrs et n'entraînent aucun effet secondaire important chez les personnes ayant un pénis.

Certaines personnes qui prennent du métronidazole pourraient présenter les effets secondaires suivants :

- Maux de tête légers
- Nausée
- Goût métallique

Il est important de **ne pas consommer d'alcool** pendant les 7 jours au cours desquels vous prenez du **métronidazole**, car l'alcool pourrait interagir avec le médicament.

Un petit nombre de personnes pourraient présenter une légère rougeur ou une irritation de la peau du pénis causée par la **crème à la clindamycine**. Cela n'entraîne généralement pas la nécessité d'arrêter l'usage de la crème.

Si vous présentez des symptômes qui vous inquiètent pendant que vous prenez les antibiotiques, consultez votre médecin

Important

- Il est impératif de **ne manquer aucune dose de crème ou comprimé au cours des 7 jours**. Si vous oubliez une dose ou un comprimé, continuez à prendre les antibiotiques deux fois par jour jusqu'à la fin du traitement.
- Si possible, prenez les médicaments aux mêmes dates que celles où votre partenaire prend les siens.
- Il est recommandé d'**éviter tout contact sexuel** jusqu'à la fin du traitement des deux partenaires pour éviter l'échange de bactéries entre eux et le retour de la VB. Cela est une pratique courante pour tout traitement antibiotique de partenaires. Si vous avez des rapports sexuels entre le pénis et le vagin, utilisez un préservatif et sachez que la crème récemment appliquée pourrait affaiblir les préservatifs en latex.



MSHC
MELBOURNE SEXUAL HEALTH CENTRE
Part of AlfredHealth

NYC
Health