

甲硝唑与克林霉素使用说明（用于有阴茎的伴侣）

简介

细菌性阴道炎 (Bacterial vaginosis, BV) 的伴侣治疗已证实可提高 BV 治愈率并减少重复感染。

BV 伴侣治疗涉及以下两种药物的联合使用：

- **片剂**——名为甲硝唑 (metronidazole) 的口服抗生素，以及
- **乳膏**——名为克林霉素 (clindamycin) 的抗生素

片剂可清除尿道（尿液排出的管道）内的 BV 细菌，乳膏可清除阴茎表皮上的 BV 细菌。

片剂使用说明




每日早晚各服一片，连续服用 7 天。片剂应随餐服用。

乳膏使用说明

每日早晚各涂抹一次，连续涂抹 7 天。如打算淋浴，请在淋浴后涂抹乳膏，因为水会冲掉乳膏。**请遵循步骤 1-5 操作。**

1.




如图所示，挤出食指指尖至第一指节长度的一条乳膏

2.




如有包皮，要撻开包皮后，再涂抹乳膏

3.




将乳膏涂抹在龟头表皮上，应覆盖从龟头顶端直至龟头下方冠沟的整个面积

4.



再次挤出食指指尖至第一指节长度的一条乳膏

5.



将这第二条乳膏从阴茎龟头下方的冠沟涂抹至阴茎根部，确保覆盖整个阴茎体。轻轻揉搓，使乳膏充分渗入皮肤。



视频说明



更多信息

安全信息

以甲硝唑和克林霉素联合治疗细菌性阴道炎的方案已沿用多年。这两种抗生素对于有阴茎者而言，均呈现为安全且没有显著副作用。

部分人员服用甲硝唑后可能出现以下副作用反应：

- 轻微头痛
- 恶心
- 口中有金属味

服用**甲硝唑**的 7 天疗程中**严禁饮酒**，这一点至关重要，因为酒精可能与药物发生相互作用。

少数人使用**克林霉素乳膏**后，可能出现阴茎皮肤轻微发红或刺激感。通常情况下，无需因此停用乳膏。

如在使用抗生素期间出现任何令您担忧的症状，请咨询医生。

重要事项

- 务必在 **7 天内按时使用乳膏和片剂，不可漏用**。若漏用一次，继续按每日两次的频率使用这些抗生素，直至完成疗程。
- 如有可能，与伴侣在同一时段内协同用药。
- 在双方均完成治疗前，请**避免所有性接触**，以防止伴侣间细菌交叉感染及 BV 复发。这是抗生素伴侣治疗的标准做法。如发生阴茎-阴道性行为，请使用安全套，同时需注意，刚涂抹的乳膏可能会削弱乳胶安全套的效果。



MSHC
MELBOURNE SEXUAL HEALTH CENTRE
Part of AlfredHealth

NYC
Health