

Indicaciones de metronidazol y clindamicina para parejas sexuales que tienen pene

Información

Se ha demostrado que el tratamiento para parejas sexuales con vaginosis bacteriana (bacterial vaginosis, BV) mejora la cura de la BV y reduce la reiteración de las infecciones.

En el tratamiento para parejas sexuales con BV, se combinan:

- **Una pastilla:** un antibiótico oral llamado metronidazol Y
- **Una crema:** un antibiótico llamado clindamicina

Las pastillas eliminan la bacteria causante de la BV del interior de la uretra (el conducto por el que pasa la orina), en tanto que la crema elimina la bacteria causante de la BV de la piel del pene.

Indicaciones para las pastillas




Tome una pastilla por la mañana y una pastilla por la noche durante 7 días. Las pastillas deben tomarse junto con la comida.

Instrucciones para el uso de la crema

Aplíquese la crema por la mañana y por la noche durante 7 días. Si tiene previsto tomar una ducha, aplíquese la crema después de la ducha, ya que el agua eliminará la crema. **Siga los pasos 1 a 5.**

1.




Aplique una línea de crema desde la punta del dedo hasta el primer dobléz, como se muestra en la imagen.

2.




Si tiene prepucio, deslícelo hacia atrás antes de ponerse la crema.

3.




Distribuya la crema sobre la piel de la cabeza del pene. Debe cubrir toda la cabeza, desde la punta del pene hasta la marca justo debajo de la cabeza.

4.



Aplique una segunda línea de crema desde la punta del dedo índice hasta el primer doblez.

5.



Distribuya esta segunda línea de crema desde la marca debajo de la cabeza del pene hasta la base. Asegúrese de cubrir toda la superficie. Frote la crema suavemente para que penetre en la piel.



Instrucciones en video



Información adicional

Información de seguridad

Tanto el metronidazol como la clindamicina se han usado durante muchos años para tratar a las personas con vagina que tienen BV. Ambos antibióticos son seguros y no presentan efectos secundarios relevantes para las personas con pene.

Es posible que algunas personas que toman metronidazol experimenten los siguientes efectos secundarios:

- Dolor de cabeza leve
- Náuseas
- Sabor metálico

Es importante **no consumir alcohol** durante los 7 días del tratamiento con **metronidazol**, ya que puede interferir con el medicamento.

Un pequeño número de personas puede experimentar un leve enrojecimiento o irritación en la piel del pene provocada por la **crema con clindamicina**. Por lo general, no es necesario interrumpir el uso de la crema.

Si tiene algún síntoma que le preocupe mientras toma los antibióticos, consulte con su médico.

Importante

- Es importante **no omitir dosis de la crema ni de la pastilla durante los 7 días del tratamiento**. Si olvida una dosis, siga tomando el antibiótico dos veces por día hasta terminarlo.
- Si es posible, tome el medicamento en los mismos días que su pareja sexual toma su medicamento.
- **Evite todo tipo de contacto sexual** hasta que ambas personas hayan terminado el tratamiento para evitar el intercambio de bacterias entre parejas y la reaparición de la BV. Esta es una práctica habitual para el tratamiento con antibióticos en parejas sexuales. Si tiene sexo pene-vaginal, use un condón y tenga en cuenta que, si la crema se aplicó en forma reciente, puede debilitar la resistencia de los condones de látex.



MSHC
MELBOURNE SEXUAL HEALTH CENTRE
Part of AlfredHealth

NYC
Health