

Metronidazole און clindamycin אנווייזונגען פאר פארטנער מיט א פעניס

אנווייזונגען פאר די טאבלעטן



נעמט איין טאבלעט אינדערפרי און איין ביינאכט פאר 7 טעג. די טאבלעטן זאלן גענומען ווערן מיט עסנווארג.

וועגן

באקטעריאל וועדזשינאסיס (bacterial vaginosis, BV) פארטנער באהאנדלונג האט אויפגעוויזן צו פארבעסערן BV היילונג און רעדוצירט אנטצינדונגען פון צוריקקומען.


פארטנער באהאנדלונג נעמט אריין א צוזאמשטעל פון:

- **א טאבלעט** - א אנטביאטיק וואס מען נעמט דורכ'ן מויל וואס הייסט metronidazole און
- **א קריעם** - א אנטביאטיק וואס הייסט clindamycin

די טאבלעטן רייניגן די BV-באקטעריע פון אין די יורטרע (די טוב דורך וועלכע די יורין פליסט אדורך) און די קריעם רייניגט די BV-באקטעריע פון די הויט פונעם פעניס.

אנווייזונגען פאר די קריעם


שמירט די קריעם אינדערפרי און ביינאכט פאר 7 טעג. אויב איר פלאנט צו נעמען א שויער, ביטע שמירט די קריעם נאכן שויער וויבאלד די וואסער וועט אראפשוואשן די קריעם. **פאלגט אויס שריט 1-5.**



רייבט די קריעם אויף די הויט פון די קאפ פונעם פעניס, פארדעקנדיג די גאנצע קאפ פון די אויבערשטע טייל פונעם פעניס ביז די גראוו גלייך אונטער די קאפ




אויב איר האט פאר-סקין (פאדערשטע הויט), שלעפט עס צוריק איידער שמירן די קריעם




קוועטשט א ליניע פון קריעם פון די שפיץ פון אייער פינגער ביז די ערשטע קנייטש, ווי אנגעוויזן

4.



קוועטשט א צווייטע ליניע פון קריעם פון די שפיץ פון אייער טייטל פינגער ביז די ערשטע קנייטש

5.



רייבט די צווייטע ליניע פון קריעם פון די גראוו אונטער די קאפ פונעם פעניס ביז אונטן, מאכנדיג זיכער צו באדעקן די גאנצע טייל. רייבט די קריעם איידעלערהייט אריין אינעם סקין.



ווידעא
אנווייזונגען



מער
אינפארמאציע

וויכטיג

- עס איז וויכטיג נישט צו פארפאסן קיין דאזעס פון **סיי די קריעם אדער די טאבלעט דורכאויס די 7 טעג**. אויב איר פארגעסט צו נעמען א דאזע, נעמט ווייטער די אנטיביאטיקס צוויי מאל א טאג ביז איר ענדיגט זיי.
- אויב מעגליך, נעמט די מעדעצין די זעלבע טעג וואס אייער פארטנער נעמט זייער מעדעצין.
- ביטע פארמיידט אלע געשלעכטליכע באציאונגען ביז ביידע פארטנערס האבן פארענדיגט די באהאנדלונג צו פארמיידן די באקטעריע פון ווערן אויסגעטוישט צווישן די פארטנער און פון די BV פון צוריקצוקומען. דאס איז די געווענליכע פראקטיק פאר פארטנער באהאנדלונג מיט אנטיביאטיקס. אויב איר האט יא פעניס-וועדזשיינע געשלעכטליכע באציאונגען, ביטע נוצט א קאנדאם און זייט אויפמערקזאם אז קריעם וואס איז לעצטנס געווארן ארויפגעשמירט קען לויז מאכן לעיטעקס קאנדאמס.

זיכערהייט אינפארמאציע

סיי metronidazole and clindamycin זענען גענוצט געווארן פאר אסאך יארן צו באהאנדלען מענטשן מיט א וועדזשיינע וואס האבן BV. ביידע אנטיביאטיקס זענען פארזיכערט אן באדייטנדע זייטיגע ווירקונגען פאר מענטשן מיט א פעניס. טייל מענטשן וואס נעמען metronidazole קענען האבן די פאלגנדע זייטיגע ווירקונגען:

- מילדע קאפ ווייטאג
- איבלונג
- מעטאלענע טעם

עס איז וויכטיג נישט צו טרונקען קיין אלקאהאל פאר די 7 טעג וואס איר נעמט metronidazole, וויבאלד עס קען ווירקן אויף די מעדעצין.

א קליינע צאל פון מענטשן קענען האבן מילדע רויטקייט אדער קראצעניש אויף די פענייל הויט פון די clindamycin קריעם. געווענליך טוט עס נישט פאדערן צו אויפהערן נוצן די קריעם.

אויב איר האט סיי וועלכע סימפטאמען איבער וואס איר זענט באזארגט ווען איר נעמט די אנטיביאטיקס, ביטע רעדט מיט אייער דאקטאר